

Antidepresivi u liječenju depresivnih poremećaja

Dr. Valdete Serreqi mr.sci

Uvod

Antidepresivi imaju široku primjenu u liječenju poremećaja raspoloženja širom svijeta

Izbor opisa antidepresiva treba uzeti u obzir: simptomi, moguće nuspojave, interakciju s drugim lijekovima, trudnoću i razdoblje dojenja, druga zdravstvena stanja i cijenu.

U uvjetima na Kosovu, izbor antidepresiva obavlja se na osnovu dva kriterija: ili je opisan na osnovu dostupnosti na farmaceutskom tržištu ili na osnovu njegove jeftinije cijene.

Ciljevi

Naše istraživanje ima za cilj procijeniti najčešće opisane AD za depresivne poremećaje na Kosovu uspoređujući ih s većinom propisanih antidepresiva u svijetu

Materijali i metodez


a ovo istraživanje korištena je dokumentacija specijalističke ambulante Psihijatrijske klinike u Prištini

Pregledavanje dokumentacije u razdoblje od 2011. do 2013. godine

Dijagnoza je postavljena na temelju ICD-10, a studija je uključivala samo slučajeve depresivnih poremećaja

Prikupljeni podaci analizirani su pomoću programa Microsoft Office Excel.

Rezultati/slika/tabela ili grafikon



Prema našoj studiji pokazalo se da je u razdoblju od 2011. do 2013. najviše opisan citalopram, zatim paroksetin, fluoksetin, sertralin, fluvoksamin i escitalopram.

Utvrđeno je da su najviše propisani antidepresivi oni koji pripadaju skupini inhibitora ponovne pohrane serotoninina (SSRI), koji su također prvi izbor u liječenju poremećaja depresije bilo gdje u svijetu. U 2014 godine najčešće opisanih antidepresiva su bili: Duloksetin, Desvenlafaksin, Vibryd, Citalopram, Sertralin, Fluoksetin, Desyrel, Escitalopram, Paroksetin, Venlafaksin. U svakom slučaju, NICE preporučuje da, ako se treba opisati antidepresiv za depresiju, prvi izbor je ISRS

Literature cited

- 1.Tim Hrenchir 10 Most-Prescribed Antidepressant Medications (2015)Powered by Newsmax
- 2.Hetrick SE, McKenzie JE, Cox GR, Simmons MB, Merry SN. Newer generation antidepressants for depressive disorders in children and adolescents. *Cochrane Database Syst Rev* 2012; (11)
- 3.Gartlehner G, Hansen RA, Morgan LC, Thaler K, Lux LJ, Noord M et al. Second-generation antidepressants in the pharmacologic treatment of adult depression: an update of the 2007 comparative effectiveness review.
- 4.Barbui C, Cipriani A, Patel V, Ayuso-Mateos JL, van Ommeren M. Efficacy of antidepressants and benzodiazepines in minor depression: systematic review and meta-analysis. *Br J Psychiatry* 2011; 198(1): 11-16.

Further information

© Copyright Colin Purrington. You may use for making your poster, of course, but please do not repost the template on your own site or upload to third-party file-sharing sites such as doctoc.com. This verbiage sounds mean-spirited, perhaps, but I've had people siphon off my whole site and then claim my content was public domain because they found it via Google. (Replace this text with your own.)